D 6.13/

CIVICA
F. Ant.
BIBLIOTECA BERIO

Questa Botanotheca Ligure
disegnata e dipinta in tre volumi
da Giuseppe Lertora farmacista genovese
diligentissimo esploratore della flora ligustica
(n. 1784 – m. 1838) non 1838 ma 1841 –
e da lui lasciata al primogenito Nicolò
successogli nella farmacia
e m. nel 1888
passò quindi al secondogenito Demetrio
Presidente del Collegio dei Procuratori legali
(n. 1829 – m. 1907)
e in fine alla figlia di lui Clotilde
che ne fa dono alla Civica Biblioteca Berio
oggi 19 giugno 1939 XVII

Lertora Clotilde

CIVICA
BERIO
…ENOVA
R.F.
V
3
25

D bis
12
4
15 - 16 - 16 bis

m. r.
V
3
25

CIVICA
BIBLIOTECA BERIO
F. Ant.
m. r.
V
3
25
GENOVA

Questa Botanotheca Ligure
disegnata e dipinta in tre volumi
da Giuseppe Lertora farmacista genovese
diligentissimo esploratore della flora ligustica
(n. 1784 – m. 1838) non 1838 ma 1841 -
e da lui lasciata al primogenito Nicolò
successogli nella farmacia
e m. nel 1888
passò quindi al secondogenito Demetrio
Presidente del Collegio Dei Procuratori legali
(n. 1829 – m. 1907)
e in fine alla figlia Di lui Clotilde
che ne fa dono alla Civica Biblioteca Berio
oggi 19 giugno 1939 XVII

Lertora Clotilde

BOTANOTHECA

LIGORE

IMAGINI

DISEGNATE

DA

G. L.

Vol.me Primo

BIBLIOTECA CIVICA BERIO
GENOVA

BIBLIOTECA CIVICA BERIO
GENOVA

Swartzia Triphylla Grandiflora. Raddi viaggio. al Brasile. Antologia N.º XXIX maggio. 1823.
S. foliis ternatis, petiolo marginato, foliolis elliptico-lanceolatis acuminatis undulatis, inter=medio majore, petalo magno luteo.

Descriptio.

Folia ternata, petiolata, alterna, foliolis elliptico-lanceolatis, acuminatis, nonnihil coriaceis, margine leviter undulatis, utrinque glaberrimis, medio ampliori longo petiolo partiali munito: Petioli marginati, marginibus ejusdem foliolorum substantiae, ad extremitatem latioribus et dentibus duobus aliquantulum incurvis, terminatis: Stipulae duae minutissimae, lineari-subulatae, interdum pilosiusculae, deciduae, ad basim cujusque petioli opposite sitae.
Flores axillares et terminales, pedunculati: Pedunculi axillares tri-vel quadripartiti, foliis breviores; terminales multipartiti; longitudinis plerumque foliorum.
Bracteae stipulis prorsus similes
Calyx: Perianthium monophyllum, coriaceum, externe viride, interne pallidum, globosum, ante florescentiam integrum, deinde in plures partes fere usque ad basim irregulariter finditur.
Cor: Petalum unicum, laterale, magnum, subrotundum, brevissime unguiculatum, luteum, venosum integrum.
Stamina numerosissima: Filamenta declinata basi subcoalita, inferiora circiter septuaginta et breviora, superiora plerumque sex, longiora et crassiora aeque ac antherae: antherae didymae, flavae, posterius nigrae in centro.
Germen superum, sublineare, arcuatum, compressiusculum, glabrum, pedicellatum: Stylus bre=vissimus: Stigma simplex.
Legumen breviter pedicellatum, oblongum, subventricosum, uniloculare, bivalve, valvulis coriaceis, glaberrimis.
Semina tria, saepius quatuor, aliquantum caustica, oblonga, subangulata, arillata, fusco-nitentia suturae inferiori valvularum per funiculum umbilicalem fimbriatum adfixa: Hilum albicans.
Obs: Differt a Possira arborescenti Aubl. (Swartzia triphylla W.) magnitudine petali, qui bis excedit staminum longitudinem, margine integro nec fimbriato, duplici sta=minum numero, et calycis divisionum irregularitate.
Swartzia Triphylla Grandiflora. arbor pulcherrima viginti pedes et amplius habens altitudinis, ad Capparidearum. Juss. familiam pertinens, ad primum ordinem XIII. Classis Linnaei (polyandria monogynia) et ad ordinem naturalem XXV (Putamineae). ejusdem
Invenitur in vicinis Rio de Janeiro, praesertim prope Mataporcos, ubi primum inspexi. Floret decembri, et fructus maturat aprili: Nota est Lusitanis sub nomine Páo de dardo, quia Brasiliani ejus ligno utuntur ad telorum cuspides conficiendas.

Periploca graeca Linn. syst. veg. 303. Willd. 292, 1. Jacq. misc. tab. 1. f. 2.

P. floribus interne hirsutis, corymbo terminali, foliis ovato-ellipticis acutis. Will. l. c.

apocynum. 2. Clus. hist. 1. p. 125.

Habitat in Oriente: in hortis culta: flor. majo junio. Genuae.

Descr: Caulis longus, sarmentosus, geniculatus fuscus, fol. opposita, lanceol-ovat. venosa. Fl. in extremis ramulis lateralibus, sub 5-. Cor. lacin. expansis, intus luteo-virescent. supra obsolete purpur. cum macula viridi. Vit. Summ. pl. 1. R. p. 78.

Rhus Toxicodendron Linn. Syst. veget. 369. 9.

R. foliis ternatis: foliolis petiolatis, angulatis, pubescentibus: caule radicante. <u>Dioicum</u>.

Rhus radicans Linn. Syst. veget. 369. 8.

R. foliis ternatis; foliolis petiolatis, ovatis nudis, integerr. caule radicante. <u>Dioicum</u> Linn.

Habitat Virginia, Canada ♄.

Metrosideros?

Pontederia Cordata Linn. syst. veg. p. 261. Viteman Summ. pl. t. 2. p. 273.

P. foliis cordatis, floribus spicatis. Vit. l. c.

Sagittae similis planta palustris virginiana spica florum cerulea Moris. Section. tab. 4. f. 8.

Habitat in virginiae aquosis. 4.

descript. Radix fibrosa, adgregata. caul. spitham. simpl. Petiol. vaginantes. fol. Sagittariae similia, acuta, nervosa; cor. purpureo-coerul. cum macula lutea.

In hortis educata

Begonia nitida Willd. 1039. 1.

B. fruticosa erecta, foliis glaberrimis inaequaliter cordatis obsolete den=
=tatis, capsulae ala maxima subrotunda. W. l. c.

Flores; albi mai. Jun. august.

Habitat Jamaica montib. in hortis educata Germ.

13 Pelargonium Zonale? Willd. sp. 3. p. 667. (Linn. syst. veg. p. 511. 11. Vit. Summ. pl. t. 4. p. 96. Geranium Zonale)

P. Calyc. monophyll. fol. cordato-orbiculat. incisis, zona notatis; caul. fruticoso. Vit. l. c.

Habitat in Africa ~~[illegible]~~. sed in hortis excolitur. Floret ~~[illegible]~~. vere ad autumno. ♄.

4.

Diosma ericoides: foliis trigonis obtusis glabris, floribus terminalibus sub-
-solitariis. Berg. 550. 9.

Flores: aprili, et tota aestate

Gemmae. in Hortis culta Habitat. Cap. Bon. Sp.

Obs. odore fragrante contrita inter digitos

Salvia aurea? Linn.

Flores april. mai.
In hortis culta Genuae. ♄.

Fabricia laevigata: Foliis lanceolato-obovatis alternis glaucescen=
=tibus nervoso-venosis, dentibus calycinis triangularibus. Willd. 575, 1.

Fl. april. maj.
Genus in Hortis cultu. Nov. Oland. Habitat. ♄.

Fabricia Levigata?

Flores marti. april.
Genu. in Calidariis Culta.

Leptospermum?
Melaleuca ericifolia?

Aesculus Pavia: foliis quinatis, corollis tetrapetalis, petalorum conniventium unguibus longitudine calycis, staminibus corolla brevioribus, fructibus inermibus. Will. 258, 2.

Flores april. mai

Genus in Hortis culta Habitat nell America Boreale ♄.

Ital. Pavia rossa.

Phyllanthus. ovalifolius? Linn

In hortis culta flores april. mai. ♄.

Spiraea hypericifolia:

Flores april. mai.

Genuq in hortis culta. Habitat.

Ribes

Flores april. mai.

Genus in Hortis educatus.

Obs. Flores leviter odori, ~~[illegible]~~ caryophylli

Tradescantia virginica

Cestrum pargui

Asclepias fruticosa.

Cineraria amelloides

Melaleuca ericifolia Willd.

Spirea ~~grossa~~ glutinosa

~~Solidago altissima 8 ... 1769.~~

Lobelia fulgens Willd.



Hibiscus. Rosa-sinensis

Fuchsia triphylla L.

Houstonia coccinea . Ixora Jacq.

Justicia coccinea

Racchary

Statice

Euphorbia.

trovata in un giardino in albaro, nata per azzardo.

Lagerstroemia indica Linn. Willd. 619, 1.

L. petalis crispis, panicula terminali, foliis subrotondo-ovatis acutis glabris. W.

flor. august. sept. octob.

Habit. China in hortis culta Genuæ.

Stapelia Variegata L.

Georgina W. Dahlia Pers.

Tarchonanthus camphoratus

Corchorus japonica. flore pleno.

Amaranthus

ocymum polystachium L.

37 flores tetrandri. fauce barbata

Verbena mexicana? L.
Verbena aubletia Linn. Buchnera Canadensis Linn. Jacq.

achyranthes Lappacea in Hort. cultur tamen in ~~Idia~~ India sponte. nasc.

88

5.

Gnidia simplex Linn.

Lychnis Coronata Linn.

41

I. flosculo al naturale
2. id. veduto colla lente
3. femina veduta colla lente

Cacalia Sagittata Will.

~~Cacalia Farfarifolia? Lin~~
Cacalia Porophyllum Vit. ut Icon. Moris. hist. 3. S. 7. tab. 11. f. 7



Calycanthus? praecox
flore odore fragrantissimo

Rhododendron ~~[illegible]~~ ponticum.

Cacalia Sonchifolia vit. Summ pl + 4. p. 464.

amaranthus caudatus

Salvia splendens

Ruellia formosa
Justicia Adhatoda — Calice 5 partito; Stami bifidi; corolla leggierm. pubescente; caule 4 angolo pubescente; una glandula nelle biforcature dei rami che sembra una gemma; foglie opposte venose, scabre, pubescenti; fiori in Giug. in Genova nell' Orto di Durazzo allo Zerbino.

Ixia crocata Linn.

Melone barbata?

A
B
C.
D
e

Ipomaea Quamoclit?

50

Coreopsis tinctoria

Gloxinia integrifolia [illegible]? Linn.
Gloxinia speciosa Link

Begonia discolor

Tillandsia stricta?

AYENIA MAGNA



Erythrina Corallodendrum.

JH

Iris chinensis. W.

Mespilus Japonica Vit. t. 3. p. 230

57

Corolla tubolosa 5. fedia

Stami n.º 4

alli chequaglia nei pas[illegible] per andare alle

[illegible] fiorio in Genaio.

Pogonia Glabra andr.
Myoporum Ellipticum
andrewsxia glabra vent.



Lonicera Symphoricarpus Willd. [illegible] pl. t. 1 p. 467
Symphoricarpus vulgaris.
~~[illegible] cymosa?~~
Chimarrhis cymosa Spreng. [illegible] 61 fl. Lul. all'acquaiola sotto il bastione di [illegible]

Lilium tigrinum Schultz tom 7 p 406 in China et Japonia



Rhus viminalis Spreng. t. 1. p. 936

61

a fiore al naturale
b detto ingravidito.
c detto della circonferenza ogni raggio.

Phylica ericoides

Halleria lucida Linn.

Nicandra physalodes Sprengel!

atropa physalodes Linn.

68

Hesperis

64

I. fiore al naturale

2 germe tagliato orizzontalmente, e due stami laterali.
3. detto intero con due stami laterali, dei dieci che si trovano nel fiore
4 un petalo veduto internamente con il filamento ed il stame
5. detto veduto lateralmente

Echeveria coccinea? D.C.

66

Centaurea Nigra

75 Geranium nodosum? L.

idem

Convallaria Polygonatum Linn. sp. 451. foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus subunifloris. .... Decand. Synops. pl. 1859.

Polygonatum officinale All. fl. Ped. n. 480.

Convallaria angulosa Lam. fl. Franc. tom. 3. p. 268.

Polygonatum, vulgo sigillum Salomonis J. B. hist. 3. lib. 31. p. 529.

Loc. in collibus, et Rivolis. al Garbo –

Floret aprili, majo. – 4

71

Orchis abortiva Linn. sp. 1136.

delineata col ~~frutto~~ quasi a maturità, seguita quella in fiore

Orchis abortiva Linn. Sp. 1136 - Caule aphyllo squamis vaginato spica laxa, labello ovato integerrimo, cornu subulato germinis longitudine.

Epipactis abortiva Allion. Fl. Ped. n. 1848. = Limodorum abortivum Decand. Syn. pl. n. 2048.

Descrizione Radici fasciculate; foglie radicali nulle, squame cauline vaginanti acute; spica rara, labello eretto integerrimo ondolato, lanceolato; petalo superiore concavo includente il nettario, lacinie laterali lineari acute. Corno della longhezza del germe. Colore bianco gialognolo, e la sommità dei petali violacei.

Habitat in sylvis umbrosis et montosis a S. Ypela - et al Gorbo. — 4.

Floresc. junio

errino,

Catananche Caerulea Linn. sp. 1142. caule pubescente erecto, foliis linearibus, in=
=ferioribus remote dentato-pinnatifidis, pedunculis squamatis.... All. Fl. Ped. n. 753

Chondrilla caerulea Cyani capitulo Bauh. pin. 130.

Habitat in locis siccis sterilibus, et in collibus al Lagaso, Zerbino &c.

Flor. junio, julio, augusto. 4

male

Tamus communis Linn. sp. 1453. Caule scandente volubili ramoso, foliis alternis petiolatis cordatis integerrimis, floribus racemosis axillaribus. ... Decand. syn. gall. n. 1868. .. All. fl. Ped. n. 2116.

Vite nera Matth. valg. 1348.

Vulgatissima al Lagazzo, et S. Pantaleone

Flores albido virescentes; majo, junio. — 4.

Idem

~~Carex remota~~? Linn.

Carex divulsa. Good. Tr. Linn. 2. p. 160. Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 632.

~~calice imbricato~~, ricettacolo nudo, favoso, pappo sessile setoso

Hieracium murorum? Linn.

male

Dactylis glomerata Linn. sp. 105. panicula secunda glomerata, culmo erecto. . . .

Decand. Syn. pl. n. 1642.

Festuca glomerata All. Fl. Ped. n. 2239.

Bromus locustis tetranthis fasciculatis imbricatis Hall. hist. 1512.

Gramen spicatum folio aspero Bauh. pin. 3. prod. 9. = cum bona icone

G. panicula torosa, pratense asperum Moris. ox. S. 8. t. 6. f. 38.

Aestivis mensibus floret 4.

Ubique Genuae locis gramineis.

Dactylis glomerata

Cynoglossum omphalodes Linn. sp. 193. repens, foliis radicalibus cordatis.
Borraginis altera species Dod. Pempt. 627.

In appenninis della Bocchetta – al Garbo

Florebat aprili exeunte. Veren.

Festuca fluitans Linn. sp. 111. panicula ramosa erecta, spiculis subsessilibus teretibus muticis.
Poa fluitans. Decand. syn. pl. n. 1600. Smith. Brit. 1. p. 95.
F. fluitans. All. Fl. Ped. n. 2249.
Gramen loliaceum fluitans spica longissima divisa Moris. H. s. 8. t. 3. f. 16.
Gramen aquaticum fluitans, multiplici spica Bauh. theat. p. 41.
Aestivis mensibus floret. 4.
Loc. secus fossas ad fluentes aquas ad portam pila.

Bromus mollis?

Poa fluitans

Orchis maculata Linn. sp. 1335. foliis oblongis, labello trilobo plano crenulato, petalis superioribus conniventibus, lateralibus patentibus, cornu germine breviore, bracteis longitudine germinis. Ludit foliis puris et maculatis.

Flor. junio julio. prope duos pontes S^ti. Pantaleoni ♃.

Orchis radicibus non palmatis, caule solido. R.

Pessima



Carthamus tinctorius Linn. sp. 1162. Caule glaberrimo corymboso, foliis ovato-lanceolatis sessilibus integris subspinoso-dentatis, seminibus nudis. ... All. Fl. Pedem. n. 562.

Carthamus sive Cnicus. Bauh. Hist. 3. p. 79.

Cnicus vulgaris. clus. hist. p. 152.

Cnico. Matth. valg. 1358.

Ubique in aridis collibus Nicaeensibus ☉ allioni.

Floret Julio. —

83

~~Verbascum nigrum~~

Verbascum blattaria Linn. sp. 254. foliis glabris, radicalibus oblongis crenato-sinuatis, caulinis amplexicaulibus acutis, pedunculis solitariis folio longioribus.

¥. Spica rarissima, foliis glabris serratis cordato lanceolatis, imis semipinnatis superioribus amplexicaulibus. Hall. hist. tom. 1. n. 585.

Blattaria lutea. Bauh. hist. 3. 874.

Loc. in alveis siccis torrentium, et ad vias in collinis. Sub. albaro al Paradiso

Flor; Junio, Julio.

Asperula taurina Linn. Sp. 150

1

2

~~42~~

Tubis coalitis à pileo facile separabilibus.

Boletus bovinus Linn. sp. pl. 1646. Syst. veg. 1210. Stipitatus, pileo glabro pulvinato marginato, poris compositis acutis: porulis angulatis brevioribus.

Fungus porosus Bauh. hist. 3. p. 833.

Suillus esculentus crassus, superne fulvus, inferne nitido albidus, deinde ex flavo virescens, pediculo ventricoso, et supernae parti pilei con=colore Mich. p. 127.

Boletus Edulis Decand. syn. pl. 330. Stipite tuberoso subventricoso reticulato sub=rufescente-cinereo, pileo pulvinato latissimo fuscescente vaccino, carne immutabili, poris primo farctis albidi dein dilute flavi

Loc. In silvis apricis praesertim Castanearum, et quercuum. vulgatiss. in augustum.

2 Boletus bovinus stato disegnato dal vero [illegible] 1833 nel mese di luglio 24.

Viscum album



Thesium Linophyllum

F. 1.

F 2

f 1. Anthyllis tetraphylla
f 2. Euphorbia spinosa

F. 1.
F. 2.
F. 3.

1 Medicago marina f. 1.

2 Anthyllis Barba Jovis f. 2.

3 Ornithopus compressus Linn. f. 3.

a
b



Luzula Campestris · Juncus Linn.

F. 1

F. 2.

1 Chrysanthemum Segetum Linn.

2 Lathyrus palustris

Robinia viscosa W. fl. Junio. Julio. all'acquajola

Vicia Cassubica. Linn.

F. 1.

94

α semi lisci, ingranditi, impiantati sul calice.

1. Myosotis annua. M. scorpioides α Linn. In erette, fiori in aprile a Giugno.

2. Crepis Hispida. fl. Junio. Jul. all' acquajola ..

Vitex Agnus Castus.

96

A. squame quattro del calice ai bordi menbranose
. lacinia sola delle cinque componenti il calice anch'essa ai bordi menbranosa
. calice
forma di un dei 5 petali componenti la corolla

Gypsophila saxifraga Linn. sp. 584. foliis linearibus, calycibus angulatis, squamis quatuor, corollis emarginatis . . . . Decand. syn. pl. n. 4304. = Linn. Syst. veget. 563. 12. —

Lychnis pumila Caryophyllata, flore rubello Barrel. Ic. 998.

In locis aridis saxosis; ad portam Pila = Flor. a vere ad autumnum. 2.



Primula Grandiflora Lam P. acaulis Linn.

f. 1.
f. 2

B Bellis perennis. Linn. sp. 1248.. Radice repente, scapo nudo unifloro, foliis obovatis crenatis quandoque integerrimis... Decand. syn. pl. 3219. All. Fl. Ped. n. 698.

Bellis minore Matth. valg. p. 962.

Bellis sylvestris minor. Bauh. pinn. 267.

Loc. ubique in pratis. Flor. ~~[illegible]~~ autumnalis ♃. ut sentiunt Clarr. Bertolon.

f. 2 Bellis perennis

Senecio Jacobaea Linn. sp. 1219. Caule erecto foliisque lyrato-pinnatifidis glabriusculis, lobis dentatis obtusis. floribus corymbosis, radio patente.

Jacobaea vulgaris laciniata. Bauh. pinn. 131. Tourn. inst. 485.

Herba St. Jacobi Fuchs. hist. 742.

Senecio maggiore Matth. valg. sp. 1192.

Flor. augusto. Septembri.

In pratis ad vias, St. Bernardino. 4.

100

B J

Lo

f.2 6

Arum Arisarum Linn. Syst. vegetab. 1028. Spec. pl. 1370. acaule, foliis cordatis, spatha inferne integra cylindrica, spadice lineari incurvato spathę subęquali

A. incurvatum. Lam. Fl. Franc. tom. 3. p. 538.

Arisarum. Matth. 599.

ubique in viis campestribus Genuę. Peren.

Flor. vere et autumno.

erne

Schoenus
Juncus conglomeratus Linn. sp. 464. culmo nudo stricto, panicula laterali coarctato-capitata. Will. sp. 2. p. 205.
J. glomeratus flore Lob. Ic. 84.
Juncus laevis panicula non sparsa Bauh. p. 12. theatr. 183.
Juncus Cam. epit. 780. Matth. p. 1090. Bauh. hist. 2. 520.
Loc. in uliginosis, et spongiosis ad portam Vila.
Flores subflavi; Junio, Julio. ♃

Scirpus Holoschoenus Spreng. t. p. 208. syst. veget.
Isolepis Holoschoenus. Roemer. mantiss. vol. 3. p. 532.

Andropogon Gryllus Linn. sp. 1480.

A. panicula simplici diffusa, ramis apice trifloris, flore intermedio hermaphrodito apice aristato sessili basi barbato lateralibus masculis pedicellatis muticis Willd.

Flor. maio

Habitat in collibus. al Lagazzo marassi ♃. 4.

Pollinia Gryllus Spreng. Syst. veget. 1. p. 289.

F. 1.

F 2

A. Calice col Seme   10H
B Capsola con i semi
C fiore col calice
D Stame col filamento cresciuto colla lente

1 Bartsia Odontites Bert. amoen. p 32. Euphrasia Linn. sp. 841.

2 Asarum Europaeum Linn. Flor Sue. p 161

F 1

F 2

a capsola ...
b Idem ingrandite colla lente
c Pettalo della grandezza ...

1 Narcissus poeticus Linn. sp. 414. Will. sp. 2. p. 34. Allion. fl. ped. t. 2. p. 154.
N. foliis lineari-ensiformibus spatha uniflora, corona rotata, brevissima, scariosa, crenulata. Poll. fl. ver. t. 1. p. 427.

Aprili majo. floret

Habitat in montibus prope Fascie. 4. et Cratto

incompleta

2 Trollius Europaeus Linn.

Narcissus poeticus

106

A. petalo bifido
T calice 5-fido, e petalo bifido.

A. Draba verna sp. 896. foliis oblongis acutiusculis subserratis subhirtis, scapo nudo, petalis bifidis, stigmate sessili

Paronychia vulgaris Dod. Pempt. 112.

Flores albi februarii

In locis siccis, aridis; prope portem Pila in prato marginibus, vulgatissima. ⊙

B. β Cerastium semidecandrum? Linn. sp. 627.

C. hirsutum decumbens, foliis lanceolatis ~~oblongis obtusis~~, floribus pentandris, petalis ~~[illegible]~~ calyce brevioribus, capsulis oblongis.

~~[illegible]~~

Flor. albi martio, aprili

Habitat in collibus prope lo Zerbino. ⊙ Sub moeniis prope Porta Pila

Descriz. caule un poco curvo dell'altezza, al più, di un oncia e mezza, semplice, con foglie opposte, le prime picciolate, e quelle superiori sessili; tutte lanceolate, pelose, siccome il caule. calice con cinque lacinie pelose acute, i di cui margini sono cartilaginosi; ~~[illegible]~~ corolla di cinque petali bianchi divisi alla sommità, minori, ovvali, del calice. Stami cinque con le antere gialle; femina con cinque filamenti bianchi, uniti, attortigliati all' infuori. radice semplice dritta, con poche barbe, pochissimo impiantata nel terreno, ed un terzo circa al di fuori. pianta annua.

Differisce questo Cerastio dal pentandrum ~~per~~ non avere i petali intieri, e gialli nell'interno: dal C. semidecandro ~~per~~ l'essere molto più piccolo, e ~~per~~ non avere le foglie ottuse. Io lo crederei una varietà, di quest'ultimo, non ancora descritta ~~[illegible]~~.

A
B

A. Erodium præcox Willd. sp. 3, p. 631.

E. acaule pedunculis bifloris, foliis pinnatis, pinnis oblongis obtusis inæqualiter dentatis, petalis calyce duplo majoribus Willd. ... Geranium præcox Cavan. diss. 5, p. 272. t. 126. f. 2

Flores purpurei, interdum albi; ineunte vere

Habitat in locis siccis, aridis, cum Draba verna

B.

Geranium rotundifolium Linn. sp. 957.

G. pedunculis bifloris, petalis integris foliis rotundatis lobatis incisis tomentosis, Capsulis hirsutis, seminibus reticulatis.

G. secundum Matt. sp. 903.

Flores purpurascentes; aprili, maio, junio &.

Ubique in viis ☉.

obs. Tota planta pubescens, mollis subviscida, et petalis leviter emarginatis.

Narcissus Tazetta Linn. sp. 416.

N. spatha multiflora, nectario campanulato plicato truncato triplo petalis alterne latioribus breviore, foliis planis Will. sp. 2, p. 39.

N. praecox simplici flore Clus. hist. 154.

Flor.: martio, aprili

Habitat al Lagazzo. 4.

B

A

A. Veronica Cymbalaria Bert. Fl. Gen. p. 3.
V. floribus solitariis, foliis petiolatis subcordatis subseptemlobis pedunculo brevioribus, calycinis foliolis ovatis obtusis, caule ramoso prostrato.
V. hederæfolia β. Linn. sp. 19.
V. cymbalariæfolia Viv. Fl. Ital. Frag. pag. 14. tab. 16. f. 1.
Flor. martio, aprili. ~~albi~~ corolla limbo alba, fauce viridi.
In muris hortorum ubique. ☉.

B Veronica hederifolia Linn. sp. 19.
V. floribus solitariis, foliis petiolatis alternis 3-5-lobis pedunculo aequalibus, calycinis foliolis sagittatis, caule prostrato ramoso
Flores pallide cærulei; martio. aprili.
In hortis Genuensibus ubique ☉

Viola odorata Linn. sp. 1324.

V. foliis cordatis, stolonibus reptantibus, foliolis calycinis oblongo-ellipticis, utrinque obtusis.

Flor. martio-april.

Habitat ubique in aggeribus. 4.

Poa annua Linn. sp. 99.

P. panicula diffusa angulis rectis, spiculis obtusis, culmo obliquo compresso Linn.

Tota aestate floret.

Genus ubique in hortis, et secus vias. ☉

113

Lotus corniculatus Linn. sp. 1092.

L. capitulis depressis, caulibus decumbentibus, leguminibus cylindricis patentibus. Linn.

Trifolium corniculatum primum Dod. Pempt. 573.

Flores lutei; ineunte vere

Habit. in Collibus Genuensibus fere ubique; etiam inter lo Sperone, e i due Fratelli. ♃.



Alsine media Linn. sp. 389.

A. petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis Linn... Alsine minor Dod. pempt. 29.

Flores albi; a vere ad autumnum

In cultis et ruderatis vulgatissima ⊙

Cerastium vulgatum Linn. sp. 627.

C. hirsutum, foliis ovatis, petalis calyci aequalibus, floribus pedunculo longioribus, capsulis oblongis, caulibus diffusis.

C. viscosum Curt. Lond. fasc. 2, t. 35.

Myosotis arvensis hirsuta parvo flore Vaill. Bot. Paris. t. 30. f. 3.

Flores albi; aprili; maio.

In campis pascuis et ruderatis nascitur; In hortibus Gennensibus ubique ☉.

Obs. simil. C. viscoso, sed denso cespite crescens: caul. magis decumb. fol. minus lanceola magis ovatis.

A

B

[ ] Arenaria serpillifolia: foliis sessilibus subovatis, acutis, scabris, corollis calyce hirsuto brevioribus. Bl. Arenaria serpillifolia.

Flores albi. aprili.
Habitat in muris Genuæ ad portam pila, et prope S.ta Chiara.

[B] Ornithogalum umbellatum Linn. sp. 441.

O. floribus corymbosis, pedunculis bracteis longioribus, filamentis staminum basi dilatatis.
Bulbus leucanthemus minor sive Ornithogalum. Dod. Simp. 221.

Flores albi, petalis extus linea viridi notatis; aprili; maio.
In arvis nascitur; frequens ad portam pila in prato marginibus. 4

A alsine mucronata?

Hyacinthus racemosus Linn. sp. 455.

H. corollis ovatis, summis sessilibus, foliis laxis. Linn.

Muscari racemosum. Decand. syn. pl. n. 1926.

H. botryoides primus Clus. Hist. 181.

Flor. aprili.

Genuae locis herbidis collinis. 4.

Obs. Flores argute odori

Male disegnata



Symphytum officinale Linn. sp. 195.

S. foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. Linn.

Consolida maggiore Matt. p. 1012.

Flores albi vel pallide lutei. aprili:

Habitat in pratis umidis: secus aquaeductum dello Zerbino prope duos pontes, el Lagaccio

Coronilla Emerus Linn. sp. 1046.

C. caule angulato fruticoso, foliis imparipinnatis, foliolis obovatis retusis, pedunculis subtrifloris axillaribus, corollarum unguibus calyce triplo longioribus.

Flor. martio, april. In collibus Porciferæ, et in montibus extra lo sperone. ♄.

ꝗ

Coriaria Myrtifolia. Linn. sp. 1467. Decand. syn. pl. nº. 4687.

C. caule fruticoso, foliis ovato-lanceolatis trinerviis subsessilibus oppositis, floribus racemosis. —

Dioecia decandria Linn. .. Genera incertae sedis Juss. .. foemina gaudet antheris sterilibus.

Flores nunc monoici vel ex aborto dioici, nunc hermaphroditi; perigonium simplex, 5-partitum; stamina 8-10, hypogyna; antherę subsessiles, oblongę, erectę, loculis basi distinctis; in centro floris ovaria 5-basi coalita, glandulis 5 prominulis interpositis; capsulę 5-1-spermę, sponte non dehiscens.

Flores subvirides; aprili, maio. In collibus secus aqueductum dello Zerbino. ♄. al Lagaccio—

I
2

f. 1 Euphrasia latifolia Linn. sp. 841.

E. caule erecto subsimplici hirto, foliis oppositis ovatis dentato-palmatis, floribus sessilibus spicatis, calycibus membranaceis, corollis tubolosis.

Flores purpurascentes, interdum albi; aprili maio.

Habitat. in pascuis montosis; in collibus, vulgò, sopra il borgo degli Incrociati. all'acquagh...

1831.

f. 2. Centaurea Scabiosa

fl. Julio prope il Diamante loco dicto Baracca dei Poën et Cretto prope acqua...

B

A

· panicula ampliori vivipara

β Poa bulbosa Linn. sp. 102. Willd. sp. 1. p. 399. Allion. Fl. Ped. tom. 2. p. 245.

P. radice fibrosa, culmo basi bulbifero, panicula ovata subsecunda, pedunculis subgeminis, spiculis ovato-lanceolatis, subquadrifloris, flosculis basi sericeis. Pol. Fl. ver. t. 1. p. 107. – Poa bulbosa.

Spiculæ glaucescentes, ex purpureo et albo variegatæ; april. maj.

Habitat in pascuis et locis siccioribus secus vias. 4. all' acquasola vulgatissima

· Poa bulbosa Linn. sp. 102. cum varietate

Crepis Taurinensis β

Crepis praecox Balb. Miscel. Bot. p. 37. tab. 9.

C. foliis runcinato-pinnatifidis, denticulatis, pubescentibus; caule, calyceque interiori setis nigris hirto; floribus corymbosis.

Nil frequentius in omnibus collibus Genuensibus. Floret aprili, maio.

Obs. Facies omnino Crepidis biennis Engl. Bot. tab. 149. sed minor.

Hordeum murinum Linn. sp. 126.

H. flosculis lateralibus masculis aristatis, involucris intermediis ciliatis Linn.

Aestivis mensibus floret. Habitat in ruderatis et secus vias in agro Genuensi. vulg.

non esatta

Poterium Sanguisorba Linn. sp. 1411. — vulg. Pimpinella

P. caule erecto ramoso, foliis imparipinnatis glabriusculis, foliolis aequalibus subrotundis de=
=tatis, floribus capitatis terminalibus, filamentis corolla multo longioribus.

Flores subherbacei, filamenti purpurei. aprili, maio.

Habitat in pratis, et pascuis ubique. 4.

Obs. pertinet ad monoecia polyandria Linn. et agrimoniaceae Juss.

Flores sunt dioici, apetali; calix coloratus, 4-lobus, extus 3-squamosus. Masc. stamina 30. Foem. ovaria
2; stigmata penicillata; semina 2 calice capsulaeformi inclusa. —

Hordeum bulbosum Linn. sp. 125.

H. flosculis ternis, intermedio hermaphrodito longissime aristato, lateralibus masculis muticis involucro scabro brevioribus radice tuberosa.

Gramen secalinum bulbosa radice Barr. Ic. 112. f. 2.

Junio, julio floret

Genuae frequens in pascuis. alla Porta Romana, Zerbino, Lagasso. 4.

1. Trifolium pratense Linn. sp. 1082.

T. caule adscendente, foliolis ovatis subintegerrimis, capitulis ovato-subrotundis, stipulis aristatis, calycinis dentibus inequalibus, infimo corolla monopetala dimidio breviore...

fl. aprili ad septembr.

Habit. in pratis. ubique. 4

2 aristolochia pallida Vill. f. veron. t. 3. p. 41.

lutea Bertol. amoenitat. p. 418

fl. Apri. prope fasie – et fontanabuona

Linum usitatissimum Linn. sp. 397. Willd. sp. 1. p. 1533. Decand. syn. pl. n. 4446. Lois. Fl. Gal. t. 1. p. 184.
L. caule subsolitario, foliis lineari-lanceolatis, calycibus ovatis acutis trinerviis, capsulisque mucronatis. Poll. Fl. ver. t. 1. p. 411. . Lino comune.

Fl. aprili, maio.
Genus in arvis vulgatissim. ⊙

f1

f 2

F3

12 Orobus tuberosus Linn. sp. 1028. Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 454.

O. caule alato, foliis pinnatis – bi-trijugisve stipulis semisagitatis integer=rimis.

Fl. aprili maio.

Genuae in collibus a Marassi prope ai Camaldoli, et collibus 4.

Lathyrus annuus L.

Fl. april. maj. all'acquasola 1831

Lathyrus aphaca

[illegible]

Arum Italicum Lam. Dict. 3, p. 9

A. acaule, foliis albo-venosis hastato-sagittatis, lobis auriculatis divaricatis, spadice clavato spatha (triplo) breviore.–

Fl. aprili, maio.

ubique Habitat 4

mal colorita

Glecoma hederacea Linn. sp. 807.

G. Caule basi repente superne erectiusculo, foliis reniformibus crenatis petiolatis, floribus axillaribus subternis.

Chamæcissos Zagely. hist. 876.

Flores purpurascentes vel violacei, interdum albi

Fl. aprili, maio.

In arvis spongiosis, et sylvis umbrosis.

Valantia Cruciata Linn. sp. 1491.

V. caulibus subsimplicibus villosis, foliis quaternis elipticis pilosis, pedunculis ramosis bracteatis, fructibus glabris...

Flores luteoli; aprili, maio.

In sepibus et dumetis vulgatissima. 4.

Polygamia monoecia Linn. = Galium Cruciata Syn. pl. decand. 3331.

[redacted]
a. [redacted]

Allium triquetrum Linn. sp. 431.
a. Scapo nudo, foliis triquetris, staminibus simplicibus. Linn.

Fl. aprili maio.

Habit. in arvis spongiosis prope Viam publicam di S. Martino. 4.

Ranunculus arvensis Linn. sp. 780. Willd. sp. 2. p. 1329. Allion. Fl. Ped. t. 2. p. 53.

R. Caule erecto ramoso, foliis glabris, primordialibus apice dentatis, radicalibus tri=
=partitis, caulinis multifidis, segmentis linearibus, seminibus aculeatis. Pol. Fl. veron. t. 2. p. 240.

Ranunculo Campereccio...

Italiano Ranunculo dei Campi, Lappio.

Fl. aprili, maio.

Habitat in pratis siccis marginibus, prope alveo del Bisagno ☉

Ranunculus muricatus L.

Fl. aprili, maio.

Nascitur in pratis, et pascuis, prope S. Fruttuoso.

male dissegnato

Genista januensis. Viv. Elen. Plant. Hort. Bot. D.C. Dinegr. p. 10.

G. ramis argute triquetris, foliis simplicibus, lanceolatis, margine cartilagineis, rameis inferioribus obtusis; leguminibus nudis. Bert. pl. Gen. p. 85.

Genista scariosa. Viv. ann. botan. 1. p. 175. et Fl. ital. fragm. fasc. 1. p. 5. tab. 8. Loisel. notic. p. 104.

G. scariosa ramis triquetris, foliis simplicibus margine scariosis, rameis lineari-lanceolatis acutis, caulinis obovatis obtusis, floribus axillaribus racematim dispositis, leguminibus nudis, subfalcatis. Lois. Fl. Gall. loco citat.

G. florentina frutescens tota glabra, viminibus angulosis et plerumque triangularibus, foliis partim acutis, partim retusis, floribus luteis, siliquis glabris. Michel. cat. pl. hort. flor. p. 40.

Flor. aprili maio.

Habitat in saxosis, et collibus di S[ta] Bernardino, marassi. E. ♄.

Obs. valde affinis est Genistae triangulari Walds. et Kitaib. pl. rar. hung. II. p. 165. t. 153.

Galium Spurium Linn. sp. 154.

G. foliis senis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculatis simplicibus, fructibus recurvatis (saepe) glabris. Linn.

obs. affine G. aparines, sed minus.

Flor. aprili, majo.
Ubique in pascuis cultis.

Verbascum phlomoides Linn. Sp. 253.

V. foliis ovatis utrinque tomentosis, inferioribus petiolatis. Linn.

Flor. maio, junio.

In sterilibus; ~~ad marginibus agrorum~~. ♂. nel canale di Guessi-

Obs. Tomentum per aetatem evanescit.

a. b. c. Corolla, frutto, e calice ingranditi colla lente

139

Lithospermum arvense Linn. Sp. 190.

L. seminibus rugosis, corollis vix calycem superantibus.

Flores albi. aprili.
Habitat in locis steribibus, ad muros. reperitur loco dicto terralba ⊙ all'acquasola

1831

Lithospermum arvense

Avena fatua Linn. sp. 118. Willd. sp. 1. p. 447. Bertol. pl. Genu. n. 41. All. Fl. Ped. t. 2. p. 255

A. radice fibrosa annua, panicula erecto-patenti, spiculis subtrifloris, corollis omnibus aristatis, inferne pilosis. Poll. Fl. veron. t. 1. p. 136. ... Avena fatua

Spiculae virides, April. Maj, Junio. Inter segetes, et ~~in~~ agrorum marginibus ☉

Serapias ensifolia Murr. Syst. 670 ... Vitman Summ. pl. p. 231.

S. foliis lanceolato-oblongis amplexicaulibus, bracteis germine glabro brevioribus, floribus erec[tis] labello obtuso petalis duplo breviore. = Bractea infima longitudine floris, cæteræ mi=nimæ germinibus sextuplo breviores...

Epipactis ensifolia decand. syn. pl. n. 2040. ~~E. grandiflora~~ ... Will. sp. 4. p. 85.

Flor. aprili, majo. Flores albi; labello flavo maculato.

In collibus, al Garbo, Lagaccio, Marassi, E. 4.



142

a. calice con tutti i fiori - ossia calice di due valvule, moltifloro
b fiore apperto di già fecondate, lacinia esteriore aristata
c germe

Bromus sterilis Linn. sp. 113. Willd. sp. 1. p. 433. Allion. Fl. Ped. t. 2. p. 249. Lois. Fl. Gall. t. 4. 61.

β. Foliis pubescentibus, panicula nutante, spiculis retrorsum scabris, oblongis, distichis, dein flosculorum remotione superne latioribus, flosculis lanceolatis, nervosis, aristis gluma longioribus. Poll. Fl. Ver. t. 1. p. 133.

Spiculae virides vel purpurascentes, glabrae; majo in aestate in agrorum marginibus, locis sterilibus E. ☉



Bromus sterilis?

Genista pilosa Linn. sp. 999. Willd. sp. 3. p. 946. All. Fl. Ped. t. 1. p. 321. Bertol. pl. Gen. p. 84. Decand. syn. pl. n. 3806. Lois. Fl. Gall. p. 444.

G. Caule striato procumbente, foliis lanceolatis complicatis, floribus axillaribus subsessilibus, calycibus corollis leguminibusque sericeo-pilosis. Poll. Fl. veron. t. 2. p. 458. ... Genista pelosa.

Chamægenista prima Clus. hist. p. 103.

Flor. aprili, maio.

In collibus. di Marassi Sturla, quessi E. Garb. E.

Gladiolus communis Linn. sp. 52.

G. foliis ensiformibus, floribus distantibus. Linn... Gladiolus Dod. pempt. 209.

Flor. maio, junio.

In pascuis cultis vulgatissima. 4.

Viola Ruppii? allion

~~Viola montana Linn. sp. 1324~~

V. caulibus erectis, foliis oblongo-lanceolatis dentatis, stipulis lanceolatis dentatis.

V. erecta flore caeruleo et albo. Moris. hist. 2, p. 475, s. 5. t. 7, f. 7.

Flores dilute caerulei; aprili, maio et etiam autumno.

In pascuis et sylvis montosis; nel canale di Ruppi E. 4.

V. Ruppii: caule ascendente semitereti, internodiis alterne obversis, foliis cordatis, petiolatis, stipulis laciniatis, foliolis calycinis lanceolatis, superne acuminatis. Poll. fl. ver. t. 1. p. 296.

V. Ruppii allion. fl. ped. t. 2. p. 99. tab. 26. f. 6.

V. canina Bertol. pl. gen. n°. 76.



146

Seriola Aethensis Linn. sp. 1139.

S. hispida, caule recto ramoso, foliis obovatis dentatis basi attenuatis, pedunculis unifloris subcorymbosis. Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 530.

S. urens all. Fl. Ped. n. 851. t. 29, f. 1?

Floret april. maj.

Habitat in fossis Genuae prope la Porta romana, et in collibus a terralba ⊙

f. 2.

f. 1.

147

Cuscuta europaea Linn. sp. p. 180

fl. Junio Julio. in collib. ubique

1. capsula 2 locularis, loculis 2-spermis

[illegible] a Stigmata duo

2 ~~[illegible]~~ Semina 4

3 corolla 5 [illegible] fida

4 Calyx 5 [illegible] [illegible]

1. Hedysarum Onobrychis Linn. sp. 1059.

H. caule erecto, foliis pinnatis cuneatis glabris, alis calycem aequantibus, carina vexillo brevio=ri, leguminibus glabris 1-spermis aculeato-dentatis.... Caput gallinaceum Belgarum. Lob. Ic. 2. p.

Flor. maio junio.

Habitat in collibus. al Lazzio, S. Bartolomeo. Q. 4.

2. Cuscuta europaea Linn.

Fl. Junio. Jul. in collibus ubique et in fossis prope il Rubado

Vicia Sativa Linn. sp. 1037.

V. Floribus axillaribus subsessilibus subbinatis, foliolis ovato-oblongis retusis mucronatis, stipulis dentatis macula notatis.

Flores aprili, majo, junio.

Inter segetes nascitur; frequens extra portam delle Chiappe usque allo Sperone ⊙

1.

2

Orchis laxiflora Pollin. fl. ver. t. 3. p. 14.

Fl. junio prope Montobbio. Genuae.

Spica longa, floribus remotis; foliis lanceolato-linearibus subcanaliculatis, cornu obtuso ascendente, bulbis subrotundis.

Orchis variegata Bert. Plant. Genuen. n. 270. Alli. Fl. Ped. n. 1828. Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 604. et 605

O. bulbis indivisis; nectarii labio serrulato, variegato, tripartito, segmento medio bilobo; petalis cucullatis; spica globosa. ... Sitn. Sum. plant. t. 5. p. 219.

Orchis n. 1275. Hall. ... Orchis militaris, pratensis, fl. variegatis. Segu. ver. tab. 2. f. 15.
Flor. maio, junio. ♃.
Ubique in collibus circa Genuam ♃.

Carex vulpina? Linn sp. 1382.

Carex

Silene Italica caulibus pubescentibus erectis, foliis elliptico-lanceolatis inferioribus petiolatis, panicula dichotoma erecta, calycibus clavatis, petalis semibifidis nudis. All. Fl. ver. t. 2. p. 61.

Cucubalus italicus Linn. sp. 593. Willd. sp. 2. p. 686. All. Fl. Ped. t. 2. p. 84.

Petala alba. Jun. Jul. Aug.

Genuae vulgatissima ubique locis saxosis. 4.

Lychnis dioica Linn. sp. 626.

L. foliis lanceolato-oblongis, floribus dioicis.

L. sylvestris noctiflora alba simplex, calyce amplissimo. Dill. Giss. 105. t. 41. f. 1.

Flor. maio, iunio, C.

Habitat in pratis. ad portam pila. 2.

Veronica arvensis Linn. sp. 18.

V. floribus solitariis sessilibus, foliis ovato-cordatis crenatis obtusis, caulibus erectis hirtis.

Alsine serrato folio, hirsutiore, floribus et loculis cauliculis adhærentibus. J. Bauh. hist. 3, p. 2. p. 367.

Flores dilute cærulei; aprili, maio.

Habitat, in agris, ad portam pila vulgatissima ☉

154

A calyx. 5-phyllus
B capsula

[Z] Arenaria serpillifolia? Linn. vide tab. 48. f. A.

vide tab. 48 fig. A.

flor. april. maj.

Genuę locis saxosis sui spalti di porta Pila, e Romana vulgatissima

[Y] arenaria tenuifolia? Linn. sp. 607. allion. fl. ped. t. 2. p. 112. n. 1707.

floras

Genuę sub moeniis. ad Portam pila. et Romana

alsine segetalis?

Equisetum sylvaticum Linn. sp. 1516.

E. caule recto articulato fistuloso vaginato, foliis filiformibus verticillatis articulatis compositis, spica ovato-oblonga terminali.

Floret aprili, majo.

Genuae ~~prope~~ in canali, prope sepulcretum alla Foce 4.

Equisetum palustre β

Equisetum sylvaticum

Pyrethrum Corymbosum β Bertol. amoenitat. Italicae p. 193.

Allium roseum Linn. Syst. veg. 266.

A. caule planifolio umbellifero, umbella fastigiata, petalis integris, staminibus brevissimis simplicibus.

A. carneum Bert. Plant. Gen. p. 104.

Moly persici flore. Bocc. Herb. Lig. t. 2. f. 107.

Flor. aprili maio.

Ubique in collibus Genuensibus. ♃.

Obs. umbella bulbifera



Ornithopus scorpioides Linn. sp. 1049.

O. caule glaberrimo erectiusculo, foliis ternatis, foliolo impari ovato maximo, bracteis nullis..

Scorpioides Matth. valg. p. 1368.

Flor. maio, junio.

Habitat in agris. reperit. loco dicto terralba ⊙

nasce di pagnete, e storte

Lathyrus articulatus Linn. auriculatus Bert. Purpureus Desfont.

Lathyrus tenuifolius Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 457.

L.

Flores maio. Iunio.

In collibus et Marusii ... ⊙

Lathyrus tenuifolius Lois. – L. auriculatus. Bert. L. Purpureus Desf.

Trifolium repens? Linn. sp. 1080. Willd. sp. 3. p. 1359. All. Fl. Ped. n. 303.

T. Caule repente, foliolis rotundo-ovatis emarginatis serrulatis, capitulis globosis, calycinis dentibus rectis, duobus superioribus longioribus, leguminibus tetraspermis. Poll. Fl. Ver. t. 2. p. 514. Trifoglio strisciante.

Flores albi vel raro incarnati. A majo in autumnum

Genuae in pascuis et pratis vulgatiss. 4.

Italiano Trifoglio bianco, Ladino. Ladin Lombardo. Trifeuggio Genovese

Oxalis Corniculata Linn. sp. 623.

O. Caule ramoso diffuso, pedunculis umbelliferis. Linn

Oxys flavo flore Clus. Hist. 249.

Flor. maio ad autumnum

Habitat in agris et cultis ubique ⊙

Lychnis flos cuculi Linn. sp. 625.
L. petalis quadrifidis, fructu subrotundo Linn. Fl. Dan. t. 590. variat panicâ strictâ.
Flor. maio, junio.
Habitat. in pratis humidiusculis; in collibus a Granarolo 4. all'acquagola

A
B.

Stigmate urceolato.

A. Viola Tricolor, β. Linn. sp. 1326. Caule angulosa diffuso glabro, foliis oblongis crenatis, stipulis pinnatifidis.

Trinitatis herba. Fuchs. hist. 803.

Viola tricolor hortensis 6. Fl. Danic. tab. 623.

In cultis. ⊙.

B. Vinca minor Linn. sp. 304.

V. caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis, floribus pedunculatis Linn.

Clematis Daphnoides Dod. Pempt. 405.

Flores saepius caerulei; rarius albi aut rosei; martio, aprili.

Habitat prope duos pontes Divi Pantaleon. ♃.

Teucrium fruticans Linn. sp.

Foliis lanceolatis integerrimis subtus niveis, floribus axillaribus solitariis.

Flor. maio, junio.

Habitat. ♄

Astragalus Hamosus Linn. sp. 1067.

A. Caulescens procumbens, foliolis cuneatis emarginatis, stipulis ovatis, racemis paucifloris pedunculatis folio brevioribus, leguminibus hamatis subulatis glabris. Willd.

— Astragalus Monspellianus. Clus. hist. 234.

Flor. aprili: Pallide lutei.

Genua in moeniis alla Strega: in collibus allo Zerbino.

Incomplete

Adonis aestivalis Linn. sp. 771.

A. floribus pentapetalis, fructibus ovatis. Linn.

A. annua Syn. pl. Decand. n. 2621.

A. flore pallido Cam. epit. 648.

Fl. rubri, lutei; vel ochroleuci; basi intus macula nigra, vel violacea; maio, julio.

Habit. inter segetes. ☉

167

Spiraea Filipendula Linn. sp. 700.

S. foliis pinnatis, foliolis uniformibus serratis, caule herbaceo, floribus cymosis. Linn.

Flores albi extus rubelli; maio, junio.

Habitat in collibus prope Marazzi. S. Bernardino. Oregina &c.

cattiva

Asphodelus fistulosus Linn. sp. 444.

A. Caule nudo, foliis strictis subulatis striatis subfistulosis Linn.

Flor. maio

Habitat in marginibus agrorum prope guessi loco dicto in crocetta ♃
all' acquapista

Potentilla recta Linn. sp. 711.

P. caule erecto, foliis septenatis quinatisque, foliolis ovato-oblongis grosse profundeque dentatis, stipulis margine exteriori pinnatifidis, floribus corymbosis.

Flor. maio, junio.

Habitat in collibus, prope S.t Bartolomeo 4.

Spartium Junceum Linn. sp. 995.

S. ramis oppositis teretibus apice floriferis, foliis lanceolatis Linn.

Flor. maio, junio.

Habitat in collibus ubique ♄.

ombre dispegnate

Lathyrus sylvestris Linn. sp. 1033.

L. pedunculis multifloris, cirrhis ramosis diphyllis, foliolis ensiformibus, caule alato.

Floret; junio julio, augusto.

Genuæ in collibus allo Zerbino, Porta delle chiappe; in montibus inter lo Sperone et il Diamante. ♃. 4.

Obs. cum hæc planta orta pingui solo gaudeat foliolis latioribus lanceolatis, aprico vero angustioribus linearibus, semper tamen prælongis, ut repetito observavi: hinc originem duxerunt auctorum aberrationes, vel dissensus super Speciem Linnæanam. En autem eorum concordantiæ. Bertol. Fl. Genuen. p. 87.

peppino

Poa rigida Linn. sp. 101. Willd. sp. 1. p. 396. Allion. Fl. Ped. t. 2. p. 247.

P. panicula secunda, lanceolato-coarctata, spiculis subdecemfloris, linearibus, rigidis, corollis teretibus, distinctis. Poll. Fl. ver. t. 1. p. 104.

In cultis panicula viridis, in muris purpurascens. Maj. Jun. Jul. Flor. ⊙

Poa rigida?

Festuca pinnata? Vol.

Flores maj. Jun.

Genus in fossis prope portam Vila, et

Bromus mollis?

174

Ornithogalum pyrenaicum Vio. analy. Stat. pass. IC p. 132.

~~Ornithogalum narbonense Linn. sp. pl. Bert. pl. gen. n. 126~~

O. racemo oblongo, filamentis lanceolatis membranaceis, pedunculis floribusque patentibus. Linn.

Obs. Petala supra alba, subtus dorso viridia, marginibus albis.

Genue in collibus. al Lagaccio, marassi &c. floret maio.
ad portam pila.

Triticum hybernum Linn. sp. 126. Willd. sp. 1. p. 477.

T. spiculis laevibus, plerumque muticis vel submuticis.. Frumento invernale

Triticum. vulgare β. All. Fl. ver. t. 1. p. 126.

Majo floret.

In agris colitur.

Ital. siligine, calbigia, grano gentile, frumento.

Triticum aestivum Linn. sp. 126. Willd. sp. 1. p. 476.

T. spicis glabriusculis, plerumque longe aristatis. Frumento estivo...

T. vulgare α. Poll. fl. ver. t. 1. p. 126. Willd. Enum. p. 133.

In agris totius Italiae colitur. Majo floret.

Ital.^o grano grosso, Frumento marzuolo o trimestre, Civitella.

177

Papaver rhoeas Linn. sp. 726.

P. capsulis glabris globosis, caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incisis. Linn.

Floret; maio, junio, julio.

In arvis, inter segetes ubique vulgatissimum ⊙

Cytisus argenteus Linn. sp. 1043. Willd. sp. 3. p. 1128. Allion. fl. t. 1. p. 320 Poll. fl. Ver. t. 2. p. 467.
C. caulibus decumbentibus, foliolis oblongo-lanceolatis sericeis, pedunculis subternis terminalibus, leguminibus linearibus sericeis. Will. ... Citiso argenteo.

Flor. maio in locis collinis prope la Foce.

Habitat il collibus siccis. prope sepulcretum alla Foce ~~2~~ ♄.

Cytisus argenteus?

~~Phalaris pubescens Linn. sp.~~ Lam. Dict. sp. 92. Decand. syn. fl. n. 1287.
~~P. panicula ovato-cylindrica spiciformi, glumis ciliatis, foliis pubescentibus. Lois. fl. Gall. t. 1. p. 37. f. falaride pubescente.~~
~~Alopecurus litoreus All. fl. Ped. n. 2151.~~
Genuae In humidis arenosis. prope sepulcretum alla Foce ☉

Phalaris Canariensis Bert. fl. Italic. t. 1. p. 337.

Buphthalmum spinosum Linn. sp. 1274 Willd. sp. 3. p. 2231. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 179.

B. foliis caulinis alternis oblongo-lanceolatis amplexicaulibus subdentatis hirsutis, calycibus foliosis mucronatis. Poll. Fl. vern. t. 2. p. 716. ... Buftalmo spinoso.

Flor. Jun. Juli.

In locis collinis vulgatissim. ☉. T.

Pratensis
~~Trivialis L.~~

Poa angustifolia Linn. sp. 99. Willd. sp. 1. p. 387. Bertol. pl. gen. n. 28. Allion. fl. Pedem. t. 2. p. 245.

P. spiculis 3-4-floris ovatis, panicula angusta subdiffusa, perigonii valvulis lanceolatis sub-pubescentibus, vaginis culmoque laevibus, foliis inferioribus convoluto setaceis. Decand. syn. pl. n. 1610. ..... Poa angustifoglia..

Poa Pratensis B. Poll. fl. veron. t. 1. p. 109.

Flor. maj. jun.

Genuę locis gramineis vulgatissima. 4

Poa

F 1

F. 2

1 Linum strictum Linn. sp. 400. Willd. sp. 1. p. 1539. Allion. Fl. Ped. t. 2. p. 109. Decand. Syst. N. 4445.

L. calycibus subulatis, foliis lanceolatis strictis mucronatis margine scabris. Lois. Fl. Gall. t. 1. p. 185.

Jun. Jul. Flor.

In collibus Genuæ prope il Borgo Fersciati in Bisagno. et locis aridis. ☉

2 Trigonella monspeliaca

fl. maj. Jun.

prope il Rubado juxta muros

strictum

183

Stachys recta Linn. mant. 82.

S. verticillis subsexfloris subspicatis, foliis ovato-oblongis dentatis sessilibus, caulibus basi decumbentibus, superne adscendentibus.

Flor. maio et aestivisque mensibus

Habitat in collibus et locis siccis, [illegible] allo Zerbino 4.

caulibus

Silene nocturna Linn. sp. 595.

S. floribus spicatis alternis secundis sessilibus, petalis bifidis Linn.

Flor. maio. junio.

Habitat in moeniis. extra portam dello Zerbino. Inter muros prope i Montebuni, marassi. Q. ⊙.

ontebuni;

Lonicera caprifolium Linn. sp. 246.

L. floribus verticillatis terminalibus sessilibus, foliis summis connato-perfoliatis. Linn.
Caprifolium Italicum Dod. pempt. 411.

Flor. maio, junio.

Habitat in collibus S. Bernardino, Lagasso, Marassi. ♄

BIBLIOTECA CIVICA BERIO GENOVA

Inp. n° 827

Mod. 8
COMUNE DI GENOVA
BIBLIOTECA BERIO
N. 827

1

BIBLIOTECA CIVICA BERIO
GENOVA
m.r.
V
3
25